

# 母子保健の歴史



**SHOKO Maruzeni**

# 乳児死亡とは

生後1年未満の死亡のこと

4週(28日)未満の死亡を新生児死亡

1週(7日)未満の死亡を早期新生児死亡



# 乳児死亡率とは


出生時から満1歳に達する日までに死亡する確率

出生1,000人あたりの死亡数で表す。



幼児死亡率 (1000人の生産毎)

# 乳児死亡率



- < 7
- 7 ; 12
- 12 ; 18
- 18 ; 25
- 25 ; 38
- > 38

情報元 : 世界銀行 - 2015

Copyright © Actualitix.com All rights reserved



# 妊産婦死亡とは

妊産婦（妊娠中および妊娠終了後満42日未満）  
の母体の死亡のこと



# 妊産婦死亡率とは

1年間の出産数または出生数10万人に対する妊産婦死亡の数


妊産婦死亡率＝

$$\frac{\text{年間妊産婦死亡数}}{\text{年間出産数(出生数+死産数)}} \times 100,000$$



# 妊産婦死亡率

Maternal mortality ratio (per 100 000 live births), 2015




The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization  
Map Production: Health Statistics and  
Information Systems (HSI)  
World Health Organization



© WHO 2015. All rights reserved.

# 日本の乳児死亡率・妊産婦死亡率の推移





# 1925年頃 高い妊産婦死亡率の要因

1. 妊婦検診制度の未整備
2. 一般の人の妊娠・出産に関する科学的認識がない
3. 多産
4. 出産直前まで過重労働
5. 専門技術を身につけた分娩介助者の不足




# 1925年頃 高い乳児死亡率の要因

1. 新生児ケアの欠如
2. 栄養失調
3. 劣悪な衛生環境による下痢症
4. 不衛生な住環境による急性呼吸器疾患
5. 親の知識や理解の不足



# 日本の乳児死亡率・妊産婦死亡率と 母子保健の取組み



# 日本の母子保健向上の要因 1

基本的条件：

教育水準・生活水準・医療水準の向上  
国民皆保険制度



# 日本の母子保健向上の要因 2

専門的な促進要因:


各種の母子保健施策

施設分娩の推進

周産期医療の進歩



# 自宅分娩と乳児死亡率



# 日本の母子保健向上の要因 3

日本特有の要因:

村レベルの公衆衛生活動

住民参加

母子保健手帳の活用

母体保護法



# 母子健康手帳の効果

親の子育てに関する意識が向上  
医療関係者と母親とのコミュニケーション  
母子保健情報の提供  
妊娠・出産・成長の記録化





ベトナムの課題は？



ベトナムの対策は？

